

# California

## Wintergerste (zweizeilig)

Züchter/Züchtervertrieb: Limagrain

Sortentyp: Bestandesdichtetyp

Zulassung

2012

Sorteneigenschaften		Standortempfehlung	
Frühsaateignung	■■■	leichte Böden	■■■
Spätsaateignung	■■■	gute Böden	■■■
Anbau nach Mais	■■■	schwere Böden	■■■
Mulchsaat	■■■	Betriebe mit Organik	■■■
Auswinterungsneigung	mittel	Trockentoleranz	■■■
Resistenz GMV	Typ 1	Höhenlagen	■■■

### Züchtereigene Sorteneinschätzung

Langjährig ertragstreue Referenzsorte für alle Anbausituationen mit guter Blattgesundheit und Strohstabilität. Die Sorte ist mittelfrüh im Ährenschieben, eine standfeste Hohertragsorte bei mittlerer bis guter Standfestigkeit und guter Strohqualität.

### Amtliche Sortenprüfung

California wurde 2023 nicht geprüft

### Versuchsergebnisse Saatgut2000

Keine aktuellen Versuchsergebnisse

### Ergebnisse in den LSV

Relativer Kornertrag in % Stufe II (behandelt)				
Standort		2021	2022	2023
Sachsen	Lö			
	V			
	D-Süd			
Thüringen	Lö			
	V			
Brandenburg	D			

Aussaat	Kö/m <sup>2</sup>	Lö	V	D
früh	12.09. - 20.09.	240 - 270	240 - 270	230 - 260
normal	21.09. - 29.09.	280 - 310	280 - 310	270 - 300
spät	30.09. - 10.10.	320 - 350	320 - 350	310 - 340


angestrebte Bestandsdichte				
Ähren/m <sup>2</sup>		850	850	800

Düngung	kgN/ha incl.Nmin	Lö	V	D
Bestockung	BBCH 25	50-70	50-70	50-70
Schossen	BBCH ab 30	30-40	30-40	30-40
Spätgabe	BBCH ab 37	30-50	30-50	30-50

Wachstumsreglerbedarf		mittel
BBCH 31	0,3-0,5 l/ha Moddus	
oder		
BBCH 31	0,3-0,5 l/ha Moddus	
oder plus		
BBCH 37-39	0,3-0,5 l/ha Camposan	

Fungizidintensität		mittel
keine Behandlungsschwerpunkte		

### Sortenbeschreibung nach Kriterien des BSA



■-geeignet ■-gut geeignet ■■-sehr gut geeignet ○ nicht geeignet

\* Züchtereinstufung/-empfehlung; 1=sehr früh/niedrig/kurz - 9=sehr spät/hoch/lang