

Lomerit

Wintergerste (mehrzeilig)

Züchter/Züchtervertrieb: KWS Lochow / KWS Getreide

Sortentyp: Einzelährentyp

Zulassung

2001

Sorteneigenschaften	Standortempfehlung
Frühsaateignung	leichte Böden
Spätsaateignung	gute Böden
Anbau nach Mais	schwere Böden
Mulchsaat	Betriebe mit Organik
Auswinterungsneigung	Trockentoleranz
Resistenz GMV	Höhenlagen

Aussaat <small>Kö/m²</small>	Lö	V	D
früh 12.09. - 15.09.	200 - 230	200 - 230	200 - 230
normal 16.09. - 25.09.	230 - 280	230 - 280	230 - 280
spät bis 05.10.	280 - 350	280 - 350	280 - 350
angestrebte Bestandsdichte			
Ähren/m ²	500 - 550	500 - 550	450 - 500

Züchtereigene Sorteneinschätzung

Lomerit, ein bewährter, leistungsstarker Ertragstyp mit sehr guter Kornausbildung. Die Sorte besitzt eine gute Winterhärte und eine zügige Jugendentwicklung. Sie reift früh ab, auf ausreichenden Wachstumsregler ist zu achten. Lomerit hat eine kräftige Wurzelentwicklung mit Abschluss der Hauptbestockung schon im Herbst, die ortsübliche Ausaatstärke kann um 10-15% reduziert werden.

Düngung <small>kgN/ha incl.Nmin</small>	Lö	V	D
Bestockung BBCH 25	30 - 70	30 - 70	30 - 60
Schossen BBCH 30 - 31	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Spätgabe BBCH 45	50 - 60	50 - 60	50 - 60

Wachstumsreglerbedarf	mittel
BBCH 32	0,2 l/ha Moddus + 0,2 l/ha Cerone
BBCH 32-39	0,4 - 0,6 l/ha Moddus

Amtliche Sortenprüfung

Lomerit wurde 2023 nicht geprüft.

Fungizidintensität	gering
Fungizideinsatz je nach Befallssituation. Einmaliger Einsatz ab BBCH 37 im Regelfall ausreichend	

Versuchsergebnisse Saatgut2000

Keine aktuellen Versuchsergebnisse vorhanden.

Sortenbeschreibung nach Kriterien des BSA

Wachstum/Neigung	Ährenschieben	4
	Reife	5
	Pflanzenlänge	6
	Auswinterung	4
	Lager	7
Anrälligkeit für	Halmknicken	6
	Ährenknicken	6
	Mehltau	3
	Netzflecken	6
	Rhynchosporium	6
	Ramularia	5
	Zwergrost	6
Qualitäts- und Ertrags-eigenschaften	Bestandesdichte	4
	Kornzahl/Ähre	5
	Tausendkornmasse	6
	Kornertrag Stufe 1	5
	Kornertrag Stufe 2	6
	Marktwareanteil	7
	Vollgersteanteil	5
	Hektolitergewicht	6
Eiweißgehalt	2	

■ geeignet ■ gut geeignet ■ sehr gut geeignet ○ nicht geeignet

* Züchtereinstufung/-empfehlung; 1=sehr früh/niedrig/kurz - 9=sehr spät/hoch/lang

Ergebnisse in den LSV

Relativer Kornertrag in % Stufe II (behandelt)

Standort	2021	2022	2023
Sachsen	Lö		
	V		
	D-Süd		
Thüringen	Lö		
	V		
Brandenburg	D		