

Lombardo

Wintertriticale

Züchter/Züchtervertrieb: Lantmännen / Syngenta Seeds

Sortentyp: Einzelährentyp

Zulassung 2015

Sorteneigenschaften		Standortempfehlung		Aussaat <small>kg/m²</small>		Lö	V	D
Frühsaateignung	■	leichte Böden	■■■	früh	15.09.-25.09.	250-300	250-300	250
Spätsaateignung	■■■	gute Böden	■■■	normal	26.09.-05.10.	300-330	300-330	300
Anbau nach Mais	■	schwere Böden	■■	spät	bis 15.10.	380	380	300
Mulchsaat	■■■	Betriebe mit Organik	■■	anzustrebende Bestandsdichte				
Auswinterungsneigung	gering	Trockentoleranz	■■■	Ähren/m ²		500-600	500-600	500

Züchtereigene Sorteneinschätzung

Lombardo ist eine robuste Sorte mit hohen und stabilen Kornerträgen. In der mehrjährigen Ertragsleistung und in der Winterfestigkeit an der Spitze des Sortiments, für alle Standorte geeignet, sehr gute Standfestigkeit, breite Krankheitsresistenz, Braunrost ist zu beachten.

Amtliche Sortenprüfung

Lombardo, eine langjährig bewährte Sorte, erreichte 2023 bei ortsüblichem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz in beiden Anbaugebieten stabil überdurchschnittliche Kornerträge. Auch ohne Fungizid- und ohne bzw. mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz lagen die Kornerträge im mittleren bis hohen Bereich. Pflanzenschutzmaßnahmen sollten jedoch aufgrund der starken Anfälligkeit für Mehltau und vor allem Braunrost bei mittlerer Standfestigkeit dennoch eingeplant werden. Unter Befallsbedingungen kann zudem Gelbrost auftreten. Lombardo reift mittel, ist sehr winterhart und besitzt ein mittleres Hektolitergewicht. Die Auswuchsfestigkeit ist mittel bis gering. Mehrertrag durch Intensivierung: durchschnittlich.

Eigene Erfahrungen Saatgut2000

keine aktuellen Versuchsergebnisse

Ergebnisse in den LSV

Relativer Kornertrag in % Stufe II (behandelt)

Standort		2021	2022	2023
Sachsen	Lö	97	98	101
	V	100	101	102
	D-Süd	97	98	
Thüringen	Lö	99	98	103
	V	109	100	105
Brandenburg	D	98	102	102

Düngung <small>kgN/ha incl.Nmin</small>		Lö	V	D
Bestockung BBCH	21-25	40-70	40-70	40-70
Schossen BBCH	30-31	60-70	60-70	60-70
Spätgabe BBCH	37-49	40-60	40-60	

Wachstumsreglerbedarf

mittel

BBCH 29-30 0,75-1,2 l/ha CCC

BBCH 31-32 0,25-0,4 l/ha Moddus ME

Fungizidintensität*

mittel

Fungizideinsatz je nach Befallsituation. Auf Braunrost achten.

Sortenbeschreibung nach Kriterien des BSA

Wachstum/Neigung	Ährenschieben	5
	Reife	5
	Pflanzenlänge	4
	Auswinterung	2
	Lager	4
Anfälligkeit für	Mehltau	4
	Blattseptoria	5
	Rhynchosporium	3
	Gelbrost	4
	Braunrost	7
Qualitäts- und Ertrag	Ährenfusarium	5
	Bestandesdichte	5
	Kornzahl/Ähre	5
	Tausendkornmasse	6
	Kornertrag Stufe 1	7
Kornertrag Stufe 2	7	

* Züchtereinstufung/-empfehlung =sehr früh/niedrig/kurz - 9=sehr spät/hoch/lang

Quelle: Beschreibende Sortenliste DE 2023