Zwischenfruchtmischungen

Saatgut Samenanteil% und Fruchtfolgeeignung																						
Mischung	Alexandrinerklee	Inkarnatklee	Leindotter	Ölrettich	Ölrettich resistent	Ölrettich muliresistent	Phacelia	Ramtillkraut	Rauhafer	Rotklee	Senf	Welsches Weidelgras	Winterwicke	Leguminosenanteil %	Saatstärke in kg/ha	Getreide	Mais	Raps	Zuckerrübe	Kartoffel	Leguminose	GLÖZ Empfehlung
Alexelia	48						52							48	12		•••	•••	••	••	0	4,6,7
Phacelia Top							40	60							10							6,7
Mais früh				13			28	25			34				14	•••		0	0	0	0	6,7
Mais spät			56								44				14			•	0	0	0	6,7
Futter Dreierlei		11										86	3	14	40				0	0	0	4,6,7
Futter Klee Duo		20								27		53		47	35				0	0	0	4,6,7
Kartoffel					30	30			40						40	•	•	0	••	•••	•	6,7
Rübe					60		10				30				20	•	•	0		-	•••	6,7
		- se	■■■ - sehr gut geeignet / ■■ - gut geeignet / ■ - bedingt geeignet / ○ - nicht geeignet													- nich						

