



Wintertriticale 2025

Wintertriticale

Belcanto	73
Comodoro*	74
Lombardo	75
Lumaco	76

* neu im Sortiment

BSA-Einstufung / Standortempfehlung: Wintertriticale

Sorte	Seite	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Rhynchosporium	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkornmasse	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2
Wintertriticale																	
Belcanto	74	6	5	5	(1)	4	3	4	3	3	2	4	6	4	5	7	6
Comodoro*	75	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(3)	(4)	(3)	(2)	(2)	(2)	(7)	(7)	(5)	(9)	(9)
Lombardo	76	5	5	4	(2)	4	4	5	4	4	7	5	5	5	6	7	7
Lumaco	77	4	5	7	(4)	6	1	4	4	2	3	4	5	6	4	7	7

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2024 */ ()Züchterangaben

Sorte	Ertragstyp	Frühsaat	Spätsaat	Anbau nach Mais	Mulchsaat	leichte Böden	gute Böden	schwere Böden	Trockentoleranz	Betrieb mit Organik	Auswinterungsgefahr
Wintertriticale											
Belcanto	KO	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	gering
Comodoro	KD	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	gering
Lombardo	EÄ	■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	gering
Lumaco	KO	○	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	mittel

■ ■ ■ - sehr gut geeignet ■ ■ - gut geeignet ■ - geeignet ○ - nicht geeignet

Züchter/Züchtervertrieb: DANKO Saatzucht Deutschland GmbH

Sortentyp: Kompensationstyp

Zulassung 2019

Sorteneigenschaften		Standortempfehlung	
Frühsaateignung	■ ■	leichte Böden	■ ■ ■
Spätsaateignung	■ ■ ■	gute Böden	■ ■
Anbau nach Mais	■ ■ ■	schwere Böden	■ ■ ■
Mulchsaat	■ ■ ■	Betriebe mit Organik	■ ■ ■
Auswinterungsneigung	gering	Trockentoleranz	■ ■ ■

Eigenschaften:

Mittlere Pflanzenlänge, gute Standfestigkeit. Mittleres Ährenschieben und Abreife. Verlässliche Winterfestigkeit. Gute Blatt- sowie sehr gute Ährengesundheit. Gute Auswuchsfestigkeit; Empfehlenswert auch in Mais dominierten Fruchtfolgen. PFLANZENSCHUTZ LIGHT - TRAU DICH MIT BELCANTO!

Amtliche Sortenprüfung

Belcanto kommt auf ein annähernd mittleres Ertragsniveau in beiden Intensitätsstufen. Hervorzuheben ist die überdurchschnittliche Blatt- und Ährengesundheit der mittellangen Sorte. Positiv zu erwähnen sind außerdem die meist höchsten Hektolitergewichte im Prüfsortiment. Bisherige Ergebnisse sprechen für eine gute Winterfestigkeit. Durch die überwiegend mittlere bis geringere Krankheitsanfälligkeit kommt die Sorte gegenwärtig mit einem reduzierten Pflanzenschutzmittelaufwand aus und kann auch für engere Getreidefruchtfolgen gewählt werden.

Eigene Erfahrungen Saatgut2000

keine aktuellen Versuchsergebnisse

Ergebnisse in den LSV

Relativer Kornertrag in % Stufe II (behandelt)				
Standort		2022	2023	2024
Sachsen	Lö	-	-	-
	V	99	98	100
Brandenburg	D-Süd	100	101	102
Sachsen-Anhalt				

Aussaat Kö/m²		Lö	V	D
früh	15.09.-29.09.	240	270	290
normal	06.10.-15.10.	270	300	330
spät	bis 10.11.	330	350	380
anzustrebende Bestandsdichte				
		550	500	450

Düngung* kgN/ha incl.Nmin		Lö	V	D
Bestockung	BBCH			
Schossen	BBCH			
Spätgabe	BBCH			

Wachstumsreglerbedarf* gering-mittel

Fungizidintensität gering-mittel

runde Resistenzausstattung;
beobachten: ja - prophylaktisch spritzen: nicht nötig!

Sortenbeschreibung nach Kriterien des BSA	
Wachstum/Neigung	Ährenschieben 6
	Reife 5
	Pflanzenlänge 5
	Auswinterung* 2
	Lager 4
Anfälligkeit für	Mehltau 3
	Blattseptoria 4
	Rhynchosporium 3
	Gelbrost 3
	Braunrost 2
	Ährenfusarium 4
Qualitäts- und Ertrag	Bestandesdichte 6
	Kornzahl/Ähre 4
	Tausendkornmasse 5
	Kornertrag Stufe 1 7
	Kornertrag Stufe 2 6

* Züchtereinstufung/-empfehlung: 1=sehr früh/niedrig/kurz - 9=sehr spät/hoch/lang

■-geeignet ■■-gut geeignet ■■■-sehr gut geeignet ○ nicht geeignet

Quelle: Beschreibende Sortenliste DE 2023

Züchter/Züchtervertrieb: Hodowla Strelze / Kruse Saat

Sortentyp: Kompensationstyp

Zulassung

2025 EU

Sorteneigenschaften		Standortempfehlung	
Frühsaateignung	■■■	leichte Böden	■■■
Spätsaateignung	■■■	gute Böden	■■■
Anbau nach Mais	■■■	schwere Böden	■■■
Mulchsaat	■■	Betriebe mit Organik	■■■
Auswinterungsneigung	gering	Trockentoleranz	■■■

Eigenschaften:

Die begannte Sorte Comodoro aus dem Hause Strelze besticht durch sehr gute Gesundheit und Anspruchslosigkeit in der Bestandsführung. Die Erträge bewegen sich auf Spitzenniveau. Dank hervorragender Futterwerte ist die Sorte für jeden Veredelungsbetrieb ideal. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit bietet sich in der Erzeugung von Ethanol.

Amtliche Sortenprüfung

Die Sorte wurde im letzten Jahr in Sachsen nicht geprüft.

Eigene Erfahrungen Saatgut2000

keine aktuellen Versuchsergebnisse

Ergebnisse in den LSV

Relativer Kornertag in % Stufe II (behandelt)

Standort		2022	2023	2024
Sachsen	Lö			
	V			
Thüringen				
Brandenburg	D-Süd			
Sachsen-Anhalt				

Aussaat Kö/m²		Lö	V	D
früh	bis 30.09.	300	300	300
normal	01.10.- 20.10	350	350	350
spät	20.10.-10.11.	400	400	400

anzustrebende Bestandsdichte				
-				

Düngung* kgN/ha incl.Nmin		Lö	V	D
Bestockung		150 kg N/ha in 2-3 Gaben		
Schossen		80-120 kg P ₂ O ₅ /ha		
Spätgabe		120-150 kg K ₂ O/ha		

Wachstumsreglerbedarf*		gering
vorsichtig anwenden, auf leichten Standorten und bei verhaltener N-Düngung auf WTR verzichten		

Fungizidintensität		gering
nur bei Bedarf, evtl. vorsorglich eine verhaltene Gabe in EC 37-39		

Sortenbeschreibung nach Kriterien des BSA		
Wachstum/Neigung	Ährenschieben*	4
	Reife*	4
	Pflanzenlänge*	5
	Auswinterung*	2
	Lager*	2
Anfälligkeit für	Mehltau*	3
	Blattseptoria*	4
	Rhynchosporium*	3
	Gelbrost*	2
	Braunrost*	2
	Ährenfusarium*	2
Qualitäts- und Ertrag	Bestandesdichte*	7
	Kornzahl/Ähre*	7
	Tausendkornmasse*	5
	Kornertrag Stufe 1*	9
	Kornertrag Stufe 2*	9
	Fallzahl*	8
	Rohprotein*	8

* Züchtereinstufung/-empfehlung: 1=sehr früh/niedrig/kurz - 9=sehr spät/hoch/lang

■-geeignet ■-gut geeignet ■■■-sehr gut geeignet ○ nicht geeignet

Quelle: Züchtereinstufung PL 2024

Lombardo

Wintertriticale

Züchter/Züchtervertrieb: Lantmänner / Syngenta Seeds GmbH

Sortentyp: einzelährenbetonter Kompensationstyp

Zulassung

2015

Sorteneigenschaften		Standortempfehlung	
Frühsaateignung	■	leichte Böden	■■■
Spätsaateignung	■■■	gute Böden	■■■
Anbau nach Mais	■	schwere Böden	■■
Mulchsaat	■■■	Betriebe mit Organik	■■
Auswinterungsneigung	gering	Trockentoleranz	■■■

Eigenschaften:

Lombardo ist eine robuste Sorte mit hohen und stabilen Kornerträgen. In der mehrjährigen Ertragsleistung und in der Winterfestigkeit an der Spitze des Sortiments, für alle Standorte geeignet, sehr gute Standfestigkeit, breite Krankheitsresistenz, Braunrost ist zu beachten.

Amtliche Sortenprüfung

Lombardo bringt weiterhin annähernd mittlere Kornerträge in der Stufe II, mit Fungizideinsatz. Bei starkem Krankheitsdruck fällt die Ertragsleistung in der fungizidfreien Stufe I mittlerweile deutlicher ab. Die Sorte besitzt eine sehr gute Winterfestigkeit. Bei kurzem bis mittellangem Stroh besteht eine höhere Lagerneigung. Die hohe Braunrost- und Mehltau- sowie mittlere bis hohe Gelbrostanfälligkeit erfordern eine angepasste Bestandesführung. Die Sorte kennzeichnet ein mittleres Fusariumrisiko

Eigene Erfahrungen Saatgut2000

keine aktuellen Versuchsergebnisse

Ergebnisse in den LSV

Relativer Kornertrag in % Stufe II (behandelt)				
Standort		2022	2023	2024
Sachsen	Lö	100	102	99
	V	102	103	101
	D-Süd	102	102	99
	Sachsen-Anhalt			

Aussaat		Kö/m²	Lö	V	D
früh	15.09.-25.09.	250-300	250-300	250	
normal	26.09.-05.10.	300-330	300-330	300	
spät	bis 15.10.	380	380	380	

anzustrebende Bestandesdichte					
Ähren/m²		500-600	500-600	500	

Düngung*		kgN/ha incl.Nmin	Lö	V	D
Bestockung	BBCH	21-25	40-70	40-70	40-70
Schossen	BBCH	30-31	60-70	60-70	60-70
Spätgabe	BBCH	37-49	40-60	40-60	-

Wachstumsreglerbedarf		mittel			
BBCJ 29-30	0,75-1,2 l/ha CCC				
BBCH 31-32	0,25-0,4 l/ha Moddus ME				

Fungizidintensität	mittel
Fungizideinsatz je nach Befallssituation. Auf Braunrost achten.	

Sortenbeschreibung nach Kriterien des BSA			
Wachstum/Neigung	Ährenschieben	5	
	Reife	5	
	Pflanzenlänge	4	
	Auswinterung*	2	
	Lager	4	
Anfälligkeit für	Mehltau	4	
	Blattseptoria	5	
	Rhynchosporium	4	
	Gelbrost	4	
	Braunrost	7	
Qualitäts- und Ertrag	Ährenfusarium	5	
	Bestandesdichte	5	
	Kornzahl/Ähre	5	
	Tausendkornmasse	6	
	Kornertrag Stufe 1	7	
	Kornertrag Stufe 2	7	

* Züchtereinstufung/-empfehlung: 1=sehr früh/niedrig/kurz - 9=sehr spät/hoch/lang

■-geeignet ■■-gut geeignet ■■■-sehr gut geeignet ○ nicht geeignet

Quelle: Beschreibende Sortenliste DE 2023

Züchter/Züchtervertrieb: Lantmännen / Syngenta Seeds GmbH

Sortentyp: ährenbetonter Korndichtetyp

Zulassung 2021

Sorteneigenschaften	Standortempfehlung
Frühsaateignung	○ leichte Böden ■■
Spätsaateignung	■■■ gute Böden ■■■
Anbau nach Mais	■■■ schwere Böden ■■
Mulchsaat	■■■ Betriebe mit Organik ■■
Auswinterungsneigung	mittel Trockentoleranz ■■■

Eigenschaften:

mittelfrühe und frohwüchsige Sorte mit bestem Ertrag, stark auswinterungsgefährdete Standorte vermeiden, bestes Resistenzprofil, trotz längerem Wuchs gute Standfestigkeit, Doppelnutzungstyp (Korn und Biomasse für GPS), niedrige DON-Gehalte sorgen für gesundes Futter.

Amtliche Sortenprüfung

Lumaco ermöglicht annähernd mittlere Kornerträge mit Schwankungen in den Versuchsjahren in der Stufe I. Bei der längerstrohigen Sorte ist die Lagerneigung hoch. Die Blattgesundheit ist auf mittlerem bis gutem Niveau. Positiv ist die geringe Gelbrost- und Mehltauanfälligkeit. Das Fusariumrisiko ist gering bis mittel, die Winterfestigkeit nach bisher vorliegenden Ergebnissen schwächer.

Eigene Erfahrungen Saatgut2000

keine aktuellen Versuchsergebnisse

Ergebnisse in den LSV**Relativer Kornertrag in % Stufe II (behandelt)**

Standort		2022	2023	2024
Sachsen	Lö	-	-	-
Thüringen	V	96	100	102
Brandenburg	D-Süd	98	99	100
Sachsen-Anhalt				

Aussaat	Kö/m ²	Lö	V	D
früh	-	-	-	-
normal	26.09.-05.10.	250-320	250-320	290
spät	bis 15.10.	320-350	320-350	290

anzustrebende Bestandsdichte

Ähren/m ²	500-550	550-600	500
----------------------	---------	---------	-----

Düngung*	kgN/ha incl.Nmin	Lö	V	D
Bestockung	BBCH 21-25	40-70	40-70	40-70
Schossen	BBCH 32-31	60-70	60-70	60-70
Spätgabe	BBCH 37-49	40-60	40-60	-

Wachstumsreglerbedarf***mittel-hoch**

BBCH 29-30 0,75-1,0 l/ha CCC + 0,15-0,25 l/ha Camposan

BBCH 31-32 0,3-0,5 l/ha Moddus ME

BBCH 37-41 optional 1,0 l/ha Bogota GE

Fungizidintensität***mittel**

Fungizideinsatz je nach Befallssituation. Auf Rynchosporium achten.

Sortenbeschreibung nach Kriterien des BSA

Wachstum/Neigung	Ährenschieben	4
	Reife	5
	Pflanzenlänge	7
	Auswinterung*	4
	Lager	6
Anfälligkeit für	Mehltau	1
	Blattseptoria	4
	Rhynchosporium	4
	Gelbrost	2
	Braunrost	3
	Ährenfusarium	4
Qualitäts- und Ertrag	Bestandesdichte	5
	Kornzahl/Ähre	6
	Tausendkornmasse	4
	Kornertrag Stufe 1	7
	Kornertrag Stufe 2	7

* Züchtereinstufung/-empfehlung =sehr früh/niedrig/kurz - 9=sehr spät/hoch/lang

■-geeignet ■■-gut geeignet ■■■-sehr gut geeignet ○ nicht geeignet

Quelle: Beschreibende Sortenliste DE 2024